

Aminolean[®]

Injection Stérile

Acides aminés vitamines du complexe B et électrolytes

DIN 00506990



INDICATIONS

Pour aider au traitement de soutien des animaux débilités et au traitement de soutien lors de diarrhée grave chez les bovins, les porcs et les chevaux. Aminolean aide à compenser les pertes de protéines, d'électrolytes et de vitamines associées avec ces désordres.

DESCRIPTION

Injection stérile contenant des amino-acides, des vitamines du complexe B et des électrolytes pour les bovins, les chevaux et les porcs.

EMBALLAGE

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1AM1001	500 mL	12
1AM1002	950 mL	12

Voir le cote contraire pour l'Adminstration et le posologie.

Aminolean[®]

Injection Stérile

Acides aminés, vitamines du complexe B et électrolytes

DIN 00506990

Usage vétérinaire seulement

DINGRÉDIENTS ACTIFS:

Chaque 100 mL contient:

Dextrose 5 g, chlorure de calcium, dihydrate 15 mg, chlorure de potassium 20 mg, sulfate de magnésium, trihydrate 20 mg, acétate de sodium, trihydrate 250 mg, chlorhydrate de thiamine 10 mg, nicotinamide 150 mg, chlorhydrate de pyridoxine 10 mg, vitamine B12 5 mcg, 5-phosphate de riboflavine sodique 4 mg, d-panthénol 5 mg, hydrolysate de caséine*.

Chaque litre de solution fournira environ:

Dextrose 252 mmol, sodium 18 mEq, calcium 2 mEq, potassium 3 mEq, magnésium 2 mEq, acétate 18 mEq, chlorure 5 mEq, sulfate 2 mEq.

*Profil approximatif des acides aminés essentiels présents après hydrolyse par 100 mL:

Alanine 0,8 mg, arginine 1 mg, acide aspartique 2 mg, acide glutamique 6,7 mg, glycine 0,6 mg, histidine 0,9 mg, isoleucine 1,6 mg, leucine 2,5 mg, lysine 2,5 mg, méthionine 0,3 mg, phénylalanine 1 mg, proline 3,3 mg, sérine 1,6 mg, thréonine 1,4 mg, tryptophane 0,3 mg, tyrosine 0,2 mg, valine 2 mg.

INDICATIONS:

Pour aider au traitement de soutien des animaux débilités et au traitement de soutien lors de diarrhée grave chez les bovins, les porcs et les chevaux. Aminolean aide à compenser les pertes de protéines, d'électrolytes et de vitamines associées avec ces désordres.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:

Réchauffer à la température du corps avant l'administration. Administrer lentement par injection intraveineuse ou intrapéritonéale chez les bovins et les porcs. Administrer SEULEMENT par voie intraveineuse chez les chevaux.

Bovins adultes, chevaux et porcs: 2 mL/kg de poids corporel.

Veaux, poulains et porcelets: 5 mL/kg de poids corporel. Répéter au besoin, tel que recommandé par un vétérinaire.

PRÉCAUTIONS:

La solution administrée trop rapidement peut provoquer de la nausée et un syndrome de détresse. En présence de ces symptômes, cesser l'injection jusqu'à ce que l'animal soit rétabli. L'injection pourra être reprise ensuite à un rythme plus lent. Traitement de soutien seulement. En présence d'une maladie infectieuse ou de tout autre état pathologique, administrer un traitement médical approprié. Ne pas conserver les flacons entamés. Ne contient aucun agent de conservation. N'utiliser que si la solution est claire.

ENTREPOSAGE:

Entreposer à une température inférieure à 25°C. ÉVITER LE GEL.

MISE EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants.

1AMI001/1AMI002
8AMI011/8AMI015