

# Clinicide

## Détergent germicide à large spectre et désodorisant

DIN 01918060



### INDICATIONS

Clinicide est un détergent germicide tout usage et un désodorisant qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule application.

### DESCRIPTION

- Large spectre d'efficacité: bactérien, fongique et viral.
- Odeur agréable qui est attrayante pour le client de la clinique vétérinaire.
- Économique

### Emballage

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
<b>1CL1003</b>	4 L	4
<b>1CL1001</b>	20 L	1

Voir le cote contraire pour l'Adminstration et le posologie.

# Clinicide

## Détergent germicide à large spectre et désodorisant

DIN 01918060

### **Virocide • Bactéricide • Fongicide**

**Pour usage dans les hôpitaux vétérinaires et les établissements d'animaux**

#### **Ingrédients actifs:**

Chlorure d'ammonium didécyl diméthyl ..... 4,61% p/v  
Chlorure d'ammonium n-alkyl diméthyl benzyl .....  
..... 3,07% p/v

Concentré: Diluer à 1:128, soit une once par 128 onces d'eau ou 8 mL de Clinicide par litre d'eau.

Clinicide - Emploi recommandé dans les hôpitaux, les collèges, les cliniques vétérinaires, les laboratoires de sciences animales, les magasins d'animaux domestiques, les chenils et les établissements de reproduction et d'entretien d'animaux.

Clinicide est un détergent germicide tout usage et un désodorisant qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule application.

Clinicide a été testé dans l'eau dure, jusqu'à 400 p.p.m. (calculé en tant que CaCO<sub>3</sub>), plus 5% de sérum organique et s'est montré efficace contre les organismes suivants selon les méthodes d'essai courante à une dilution de 1:128:

#### **Bactéricide**

*Pseudomonas aeruginosa*  
*Staphylococcus aureus*  
*Salmonella choleraesuis*  
*Enterobacter cloacae*  
*Streptococcus pyogenes*  
*Streptococcus faecalis*  
*Enterobacter aerogenes*  
*Salmonella typhimurium*  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Proteus vulgaris*  
*Serratia marcescens*  
*Shigella flexneri*  
*Shigella sonnei*  
*Salmonella typhi*  
*Proteus mirabilis*  
*Escherichia coli*

#### **Fongicide**

*Trichophyton interdigitale*  
*Candida albicans*

#### **Virocide**

*Influenza A / Hong Kong*  
*Herpes simplex de type I et II*  
*Vaccine*  
*Rubéole*  
*Adénovirus de type 4*  
*Picornavirus félin*  
*Leucémie féline*  
*Maladie de carré canine*  
*Rage*  
*Pseudorage*  
*IBV aviaire*

**Mode d'emploi:** Pour emploi sur les surfaces dures et non poreuses telles que les planchers, les murs, les surfaces métalliques, la porcelaine et les surfaces de plastique. Retirer les gros dépôts de saleté, puis bien mouiller les surfaces. Employer 8 mL de Clinicide par litre d'eau pendant une période de contact minimum de 10 minutes en une seule application. Peut être appliqué à l'aide d'une vadrouille, d'une éponge ou d'un linge de même que par vaporisation ou trempage. Préparer une solution fraîche lors de chaque emploi. Il n'est pas nécessaire de rincer à moins que les planchers doivent être cirés ou polis.

**Précaution:** Éviter tout contact avec les yeux. Nocif si avalé. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ou les aliments par entreposage ou mise au rebut. Ne pas utiliser le contenant vide pour d'autre fin. Premiers soins: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. Pour les yeux, appeler un médecin.

**Entreposage:** Garder à une température ambiante.

8CLI201-909  
1CLI003