

Injection Pen G

Pénicilline G procaïne suspension injectable USP

Stérile

DIN 01939793



INDICATIONS

Comme aide au traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline:
Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

DESCRIPTION

Suspension injectable de pénicilline G procaïne
300 000 U.I./ml

EMBALLAGE

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1PEN003	100 mL	12
1PEN001	250 mL	12
1PEN002	500 mL	12

Voir le cote contraire pour l'Administration et le posologie.

Injection Pen G

Pénicilline G procaine suspension injectable USP

Stérile

DIN 01939793

Usage Vétérinaire Seulement

INGRÉDIENT ACTIF:

Pénicilline G procaine..... 300 000 UI/ml

Agent de conservation:

Méthylparabene 1,3 mg/ml

Propylparabene 0,2 mg/ml

INDICATIONS:

Comme aide au traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles à la pénicilline:

Bovins: Pneumonie bactérienne, diphtérie des veaux, piétin, métrite, plaies infectées.

Moutons: Pneumonie bactérienne, métrite, plaies infectées.

Porcs: Pneumonie bactérienne, érysipèle (rouget), plaies infectées.

Chevaux: Pneumonie bactérienne, métrite, gourme, plaies infectées.

POSOLOGIE: Bien agiter avant l'emploi.

Bovins et moutons: 21 000 UI/kg (7 ml/100 kg ou 0,7 ml/10 kg) de poids corporel, par voie intramusculaire, une fois par jour; continuer le traitement pendant 2 jours après la disparition des signes cliniques. Ne pas dépasser 5 jours de traitement. Ne pas administrer plus de 15 ml par site d'injection chez les bovins ou plus de 5 ml par site d'injection chez les moutons.

Porcs: 15 000 UI/kg (1 ml/20 kg) de poids corporel, par voie intramusculaire, une fois par jour; continuer le traitement pendant 2 jours après la disparition des signes cliniques. Ne pas dépasser 5 jours de traitement. Ne pas administrer plus de 10 mL par site d'injection.

Chevaux: 21 000 UI/kg (7 ml/100 kg) de poids corporel, par voie intramusculaire, deux fois par jour (à intervalles de 12 heures); continuer le traitement pendant 2 jours après la disparition des signes cliniques ou, dans le cas des infections respiratoires, pendant 5 jours après la disparition des signes cliniques. Ne pas administrer plus de 15 ml par site d'injection. Alternier les sites d'injection pour les doses successives.

NOTE: Si aucune amélioration n'est visible dans les 48 heures suivant la première dose, consulter un vétérinaire.

PRÉCAUTIONS:

En cas de réaction anaphylactique (détresse respiratoire aiguë, respiration par la bouche, position couchée), administrer de

l'épinéphrine immédiatement pour prévenir la mort.

Occasionnellement l'administration de ce produit chez les porcs peut causer de la fièvre, des vomissements, des tremblements, de l'abattement, de l'incoordination et, possiblement, la mort. Chez les truies et cochettes gestantes, des avortements peuvent en résulter.

Chez les chevaux, la pénicilline G procaine est occasionnellement associée à de l'excitation et peut causer de la douleur au site d'injection. L'utilisation répétée d'un même site d'injection peut aggraver ces effets secondaires.

MISES EN GARDE:

Afin d'éviter les résidus illégaux, ne pas injecter par voie sous-cutanée.

Bovins et moutons: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 10 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Le lait provenant des animaux traités qui est extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.

Afin d'éviter les résidus illégaux dans le lait: Ne pas utiliser chez les animaux laitiers atteints de mammite clinique ou subclinique et ne pas dépasser la posologie recommandée. On recommande l'utilisation d'épreuves en ferme pour détecter la mammite subclinique avant le traitement (C.M.T. ou autre tests) et/ou pour détecter des résidus avant la mise en marché du lait provenant des animaux traités.

Porcs: Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 8 jours après le dernier traitement avec ce médicament.

Chevaux: Ce médicament ne doit pas être administré aux chevaux devant être abattus à des fins alimentaires.

ENTREPOSAGE:

Garder à une température inférieure à 15°C. Préserver du gel. Préserver de la chaleur excessive et de la lumière.

PRÉSENTATION:

Flacons de 100 ml, 250 ml et 500 ml.

1PEN003/8PEN502

8PEN502_PenG Inj_Tech_03/11