

Iodure de Sodium

Injection de 200 mg/mL

Stérile

DIN 00604267



INDICATIONS

Pour aider au traitement de l'actinomycose et l'actinobacillose chez les bovins et comme expectorant dans les cas de maladies respiratoires bénignes chez les bovins, les chevaux et les moutons.

DESCRIPTION

Injection pour le traitement de l'actinophytose et de l'actinobacillose chez les bovins.

Utilisé également comme expectorant doux dans le cas de maladie respiratoire bénigne chez les bovins, les chevaux et les moutons.

EMBALLAGE

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1SOD009	250 mL	12

Voir le cote contraire pour l'Adminstration et le posologie.

Iodure de Sodium

Injection de 200 mg/mL

Stérile

DIN 00604267

Usage Vétérinaire Seulement

INGRÉDIENT ACTIF: Chaque ml contient:

Iodure de sodium..... 200 mg

Agents de conservation:

Alcool benzylique 0,25% p/v

Méthylparaben 0,03% p/v

Propylparaben..... 0,025% p/v

INDICATIONS:

Pour aider au traitement de l'actinomyose et l'actinobacillose chez les bovins et comme expectorant dans les cas de maladies respiratoires bénignes chez les bovins, les chevaux et les moutons.

POSOLOGIE: Administrer par injection intraveineuse.

Bovins: Actinomyose et actinobacillose: 15 ml par 45 kg de poids corporel. Répéter après 7 à 10 jours.

Bovins, chevaux et moutons: Comme expectorant: 1- 3 ml par 40 kg de poids corporel. Répéter après 7 à 10 jours si nécessaire.

CONTRE-INDICATIONS:

Contre-indiqué lors d'hyperthyroïdisme, de gestation avancée et d'intoxication aigüe aux métaux.

PRÉCAUTION: Cesser immédiatement si des signes toxiques, tels que larmoiement excessif, dyspnée ou tachypnée, se produisent. L'injection par voie sous-cutanée cause de l'irritation sévère et de l'enflure locale.

ENTREPOSAGE: Conserver entre 15°C-25°C.

MISE EN GARDE: Le lait provenant des animaux traités dans les 72 heures qui suivent la dernière dose ne doit pas être utilisé comme aliment.

1SOD009/8SOD001